

Aus der Universitäts-Augenklinik Bonn.

Direktor: Professor Dr. K. Schmidt.

Erfolge und Mißerfolge bei der operativen Behandlung des Wundstars.

Zusammengestellt aus dem Krankengut der
Universitäts-Augenklinik Bonn aus
den Jahren 1925–1936.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung des Doktorgrades

der

Medizinischen Fakultät

der

**Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Bonn**

vorgelegt am 8. Dezember 1938

von

Günther Spannagel

aus

Lüdenscheid/Westf.

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Schmidt.

Korreferent: Prof. Dr. Ebbecke.



Meinen lieben Eltern!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41546406_0128

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Operationsergebnis beim Wundstar im Vergleich zu dem Erfolg der Operationen beim Altersstar. Gleichzeitig will sie eine Unterlage schaffen zur Beurteilung der Frage, ob bei einseitigem Wundstar eine Operation empfohlen, oder im Rentenverfahren sogar erzwungen werden soll. Von vornherein kann nicht damit gerechnet werden, daß die Erfolge bei der Wundstaroperation genau so gut sind, wie bei der Operation des nicht komplizierten Altersstars. Die Möglichkeit von Komplikationen ist bei der Operation des Wundstars wesentlich größer als bei der Operation des Altersstars. Beim Wundstar sind wir gelegentlich gezwungen, ohne jede lokale Vorbereitung den Eingriff sofort vorzunehmen. Die Keimarmut bzw. -freiheit des Bindehautflakes kann in diesen Fällen nicht erreicht werden. Eine höhere Anzahl von Komplikationen bei der Operation ist demnach zu erwarten. Sehr häufig wird der Eingriff als solcher technisch wesentlich schwieriger sein als die Extraktion der getrübten alten Linse. Denn oft bestehen ausgedehnte Verwachsungen mit der Regenbogenhaut, Leucomata adhaerentia, Schwartenbildung im Pupillargebiet und nicht selten ist die Linse subluxiert.

In den weitaus meisten Fällen ist der Wundstar die Folge eines Betriebsunfalles. Es schließt sich daher häufig ein Rentenverfahren an. Bis heute fehlt in der Literatur eine Übersicht über eine größere Anzahl von operierten Wundstaren. Weiter fehlt

eine Aufstellung über den Dauererfolg nach einseitiger Linienentfernung. Wenn von verschiedener Seite bei einseitigem Wundstar die Operation empfohlen und gefordert wird, so stützt sich diese Anschauung immer nur auf die Beobachtung verhältnismäßig weniger Fälle. Es erscheint daher angebracht, an einem größeren Krankengut den Gesamtverlauf und den endgültigen Ausgang dieses Krankheitsbildes eingehend zu untersuchen.

Cramer hat sich im kurzen Handbuch der Augenheilkunde mit der Frage befaßt, welchen Nutzen die Operation des einseitigen Wundstars für den Verletzten hat. Sicher ist, daß nach gut verlaufener Operation das Sehvermögen gebessert wird.

Erfahrungsgemäß kann aber das mit Starglas ermittelte Sehvermögen nur in wenigen Fällen voll ausgenutzt werden, denn meistens werden mit einseitigem Starglas als Folge der hohen Anisometropie Doppelbilder empfunden. Weiterhin ist der binoculare Sehekt in fast allen Fällen aufgehoben. Ferner kommt es häufig zur Schiefstellung des operierten Auges.

Cramer teilt die Berufsarten ein in solche mit großer Anforderung und solche mit weniger großer Anforderung an das Sehen. Je größer die Anforderung des Berufes an die optische Leistung beider Augen ist, desto mehr treten als Folgezustand der hohen Anisometropie, des Verlustes der Akkomodationsfähigkeit und der Aufhebung des stereoskop. Sehens, unter Umständen auch der lästigen Doppelbilder, asthenopische Beschwerden ernster Bedeutung auf.

Weil ein einseitiges Starglas nur selten getragen wird, werden häufig überhaupt keine Star-

gläser verordnet, obwohl mit Glas gute Sehstärke erzielt wird. Cramer bezeichnet den Verzicht auf die Verordnung eines einseitigen Starglases als Fehler. Er steht auf dem Standpunkt, daß der binoculare Sehekt eine psychische Funktion ist und daß bei entsprechender psychischer Einstellung auch der einseitig Aphakische wieder binocular sehen lernen kann. Weiterhin hat er beobachtet, daß bei einseitig Aphakischen das einseitige Starglas für die Ferne auch gegebenenfalls ohne binoculares Sehen gut vertragen wird und häufig nach einer gewissen Zeit der Angewöhnung ein unentbehrliches Hilfsmittel für die Naharbeit ist.

Es handelt sich bei diesen Beobachtungen um Kranke aus den verschiedensten Berufsgruppen. Bei der Frage der Rentenfestlegung steht Cramer auf dem Standpunkt, daß in den Fällen, wo durch die einseitige Aphakie bzw. durch das einseitige Starglas erhebliche asthenopische Beschwerden auftreten und der Beruf hohe Anforderungen an die optische Leistungsfähigkeit des Sehapparates stellt, eine Rente von 25% gerechtfertigt ist. Im allgemeinen wird eine Erwerbsminderung von 10—15% bei einseitiger Linienlosigkeit angenommen. Diese Auffassung teilt auch in zahlreichen Entscheidungen das Reichsversicherungsamt.

Marzolph beurteilt die Erwerbsminderung ausschließlich und allein nach dem objektiven Augenbefund und nach der mit der Starbrille ermittelten Sehstärke. Die Höhe der vorzuschlagenden Rente muß von Fall zu Fall nach den besonderen Eigenarten des Einzelfalles beurteilt werden. Er selbst berichtet über 51 einseitig Linienlose, die ohne we-

sentliche Beschwerden wieder gearbeitet haben und nur eine geringe Rente erhielten.

Die Behandlung der Wahl beim einseitigen Wundstar ist ganz zweifellos die operative Entfernung der Linse. Früher sind von einzelnen Untersuchern gelegentlich Vorschläge zur konservativen Behandlung gemacht worden. So empfiehlt Libby die Anwendung von Dionin in steigender Konzentration, (1—5%) wenn ein Riß der Linsenkapfel vorliegt. Nach seiner Beobachtung soll dann die Resorption der Linsenmassen schneller vor sich gehen.

Wilbot und Wolf haben versucht, durch Stickstoff-Einblasungen in die Vorderkammer eine schnellere Resorption der Linsenmassen zu erzielen. Dieses Verfahren hat sich jedoch nicht einbürgern können. Lange und Miles berichten über spontane Rückbildung von Wundstartrübungen der Linsen. Schmidt-Rimpler rät nicht zur Operation des einseitigen Stars, wenn das andere Auge gesund ist und über volle Sehschärfe verfügt.

Nach den Erfahrungen der Universitätsaugenklinik Bonn sind konservative Behandlungsmethoden im allgemeinen zwecklos.

Wir wissen zwar, daß die getrühte und gequollene Linse des Jugendlichen häufig spontan vollständig resorbiert wird, aber die Resorptionsdauer verhältnismäßig oft sehr lang ist. Außerdem kann während der Resorption jederzeit ein Sekundär-Glaucom auftreten. In der Bonner Augenklinik wird daher jeder Wundstar, der eine erhebliche Herabsetzung des Sehvermögens verursacht, operativ entfernt. Auch Cramer tritt für die operative Entfernung des Wundstars ein. Er schreibt: „Ein vollständiger Wundstar erfordert für die Dauer seines Bestehens

bis zur operativen Beseitigung eine Rente für einseitige Erblindung. Weigert sich der Patient sich operieren zu lassen, so kann man die Höhe der Entschädigung niedriger halten, weil der Verletzte durch eigenes Wollen eine Besserung der Sehleistung verhindert.“

In der nun folgenden Aufstellung sind nach Jahren geordnet, die einzelnen Wundstare aufgeführt und zwar ist neben der Angabe über Beruf und Alter die Art der Verletzung, der Zustand der Linse vor der Operation, die Dauer des Klinikaufenthaltes und das Sehvermögen aufgeführt. Sind Sehschärfenwerte bei späteren Untersuchungen nochmals ermittelt, so sind sie in einer besonderen Spalte vermerkt.

1925

Fall	Beruf	Alter Jahre	Verletzung	Aufnahme	Linse
1	Schüler	12	Steinplitter links	16. 11.	gequollen u. getrübt
2	Schlosser	19	Eisensplitter rechts	11. 1.	in toto getrübt
3	Steinkipper	26	Steinsplitter	21. 5.	diffus getrübt
4	Schreiner	22	Kontusionsverletzg. links	8. 9.	milchig weiß getrübt
5	Arbeiter	26	Kupferdrahtverletzg. links	29. 4.	in toto getrübt
6	Schüler	9	Dorn ins linke Auge 1923	14. 1.	in die VK gequollen
7	Schüler	9	Holzstücke geg. link. Auge	11. 12.	in toto getrübt
8	Achatschleifer	42	Splitterverletzg. rechts	27. 1.	diffus getrübt
9	Schlosser	25	Eisensplitter rechts	8. 3.	in toto getrübt
10	Angestellter	28	Holzsplitter links	16. 3.	verkalkt
11	Kind	5	Nadelstich ins lk. Auge 1923	6. 7.	gequollen und getrübt

1926

12	Werkmeister	59	Explosionsverletz. rechts	11. 3.	in toto getrübt
13	Erdarbeiter	65	Steinsplitter links	26. 11.	dicht getrübt
14	Winzer	23	Stein geg. das rechte Auge 1924	19. 1.	getrübt
15	Verkäuferin	36	Kontusionsverletz. rechts	17. 9.	grau getrübt

1927

16	Arbeiter	27	Steinverletzung links	15. 10.	in die VK gequollen
17	Landwirt	16	Eisensplitter links	11. 10.	diffus getrübt
18	Landwirt	43	Holzstück geg. recht. Auge	17. 1.	in toto getrübt
19	Lehrling	16	Keine Angabe	6. 12.	gräulich getrübt
20	Schüler	14	Stopfenpistolenschuß links	1. 3.	diffus getrübt
21	Schmied	55	Eisenstück gegen linkes Auge vor 20 Jahren	15. 9.	verkalkt
22	Schreiner	21	Luftgewehrschuß links	5. 12.	toto getrübt schlotter
23	Hüttenarbeiter	38	Eisensplitter rechts	9. 2. 28	in toto getrübt

a == Nach der Staroperation b == Nach der Nachstaroperation.

Op.	Compl.	Nachstar- Op.	Entl.	Visus Entl. mit Glas		Visus bei letzter Vorstellung
21. 11.	—	—	28. 11.	a 0,4	b	0,4
14. 1.	Glaskörpervorfall	—	18. 1.	Handbewegung dicht vor d. Auge		1932 enucleiert (Spätinfection)
3. 6.	—	8. 9.	18. 6.	0,16	0,2	0,2
10. 9.	—	—	23. 9.	0,6		0,5
20. 5.	—	—	4. 6.	0,8		0,8
17. 1.	—	—	24. 1.	0,2		
12. 12.	—	—	24. 12.	0,4		
3. 2.	Ablatio	—	25. 2.	0,4		Lichtschein
11. 3.	—	—	21. 3.	0,5		0,25
18. 3.	—	—	28. 3.	0,6		0,7
7. 7.	—	1. 9. 1925	13. 7.	nicht angegeben		

1923	—	13. 3.	24. 3.	Kerzen- licht	0,2	0,2
28. 11.	Chemosis Evisceration	—	15. 12.	L = Prothese		
30. 1.	—	—	9. 2.	R = 0,5		0,3
26. 10.	—	—	15. 6.	0,5		0,5

2. 11.	—	—	17. 11.	0,1		0,2
11. 10.	—	25. 2. 28	1. 11.	0,1	0,3	0,3
14. 1.	—	27. 3. 28	25. 2.	0,50	0,16	0,2
11. 12.	—	—	20. 12.	0,3		0,5
31. 3.	—	?	13. 4.	0,2	0,6	0,6
20. 9.	—	—	14. 10.	0,5		0,6
9. 12.	—	14. 7. 29	16. 12.	0,5	0,6	0,6
9. 2. 28	—	3. 5. 28	24. 2. 28	0,2	0,2	0,2

Fall	Beruf	Alter Jahre	Verletzung	Aufnahme	Linse
24	Arbeiter	23	Eisensplitter links	24. 6.	radiär getrübt
25	Arbeiter	18	Holzstück geg. link. Auge	28. 11.	toto milchig gefärbt
26	Landhelfer	15	Vor 12 Jah. Glasscherbe	18. 7.	diff. getrübt u. ges.
27	Dreher	17	Eisensplitter links	8. 9.	getrübt
28	Schülerin	12	Holzstück geg. linkes Auge	25. 1.	in toto getrübt
29	Angestellter	23	Kontusionsverletzg. links	7. 9.	dicht getrübt
30	Schülerin	12	Nach Röntgenstrahlung	10. 7.	in toto getrübt

1928

31	Arbeiter	36	Kontusionsverletz. links	11. 1.	milchig getrübt
32	Landwirt	32	V. 5 J. Dorn ins rechte Auge 1923	28. 3.	in toto getrübt
33	Bergmann	21	Eisensplitter rechts	27. 2.	diffus getrübt u. ver.
34	Arbeiter	16	Eisendraht rechts	10. 8.	in toto getrübt
35	Arbeiter	16	Nagel i. r. Auge gestossen	4. 8.	in toto getrübt
36	Arbeiter	37	Eisenstück geg. r. Auge	24. 7.	gequollen und getrübt
37	Klempner	16	Glassplitter rechts	13. 7.	gequollen u. getrübt
38	Arbeiter	38	Stahlsplitter links	12. 9.	total getrübt
39	Arbeiter	26	Stein geg. das linke Auge	3. 2.	gleichmäßig getrübt
40	Schülerin	12	Nicht genau angeg. Steinw.	6. 11.	verkalkt
41	Kind	5	Propellerv. Spielz. i. r. Aug.	11. 10.	gequollen u. getrübt

1929

42	Blockdreher	21	Stahlsplitter rechts	6. 8. 27	getrübt
43	Arbeiter	28	Stacheldrahtverletz. rechts	10. 11. 28	in toto getrübt
44	Kaufmann	43	Stahlsplitter rechts	15. 5.	in toto getrübt
45	Lehrling	14	Holzsplitter rechts	29. 9.	gequollen u. getrübt
46	Arbeiter	22	Steinsplitter rechts	9. 7.	in toto getrübt

a = Nach der Staroperation b = Nach der Nachstaroperation.

Op.	Compl.	Nachstar- Op.	Entl.	Visus Entl. mit Glas		Visus bei letzter Vorstellung
2. 7.	Glaucom Ablatio retinae	—	24. 8.	a 0,2	b 0,4	0,4
5. 12.		—	24. 12.	—	—	—
25. 7.		—	9. 8.	Handbewegungen in 2 m Entfernung		1932 evisceriert (Spätinfektion)
10. 9.		21. 7. 31	17. 10.	0,25	0,6	0,5
3. 2.		—	28. 2.	0,2		0,2
10. 9.	—	—	24. 9.	0,1		0,1
16. 7.	—	—	26. 7.	0,4		0,3

17. 1.	—	—	24. 1.	0,2		0,6
1923	—	30. 3.	12. 4.	Licht- schein	0,2	0,2
1. 3.	—	21. 4.	28. 3.	0,1	0,2	0,2
1. 9.	—	—	20. 10.	0,2	1935 enucleiert (Spätinfek.)	0,6
16. 8.	Hornhautabsz. Enucleat.	—	8. 9.	R = Prothese		
10. 8.	—	11. 9.	3. 9.	L = 1,0	1,0	0,8
23. 7.	—	—	1. 8.	1,0		1,0
18. 9.	—	—	28. 9.	0,4		0,4
16. 2.	—	3. 11.	24. 3.	0,1	0,1	0,2
15. 11.	—	—	28. 11.	0,8		
11. 10.	—	—	25. 10.	nicht angegeben		

10. 9.	—	9. 7. 29	30. 8. 27	0,1	0,1	0,2
9. 2.	—	6. 12.	9. 3. 29	0,25	0,4	0,4
16. 5.	—	—	29. 5.	0,5		0,5
12. 10.	—	29. 11. 31.	4. 11.	0,2	0,3	0,25
12. 7.	—	14. 9.	30. 7.	1,0	1,0	1,0

Fall	Beruf	Alter Jahre	Verletzung	Aufnahme	Linse
47	Schüler	9	Eisensplitter rechts	27. 5.	diffus getrübt
48	Schuster	35	Stoß geg. Baumast links	12. 4.	getrübt
49	Schlosser	36	Kontusionsverletzg. links	28. 10.	getrübt pigmentiert
50	Schlosser	22	Eisensplitter rechts	29. 1.	verkalkt
51	Kranführer	32	Eisensplitter rechts 1919	12. 8.	verkalkt
52	Arbeiter	35	Heiße Schlacke links	1. 12. 28	gleichmäßig getrübt
53	Schüler	7	Regenschirmverletz. rechts	24. 9.	in toto getrübt
54	Kind	2	Nadelstich links	16. 9.	gequoll. u. milch. getrübt
55	Kind	3	Gabelstich links	10. 9.	getrübt, z. T. verkalkt
56	Schülerin	7	Nadelstich rechts	10. 7.	gequollen u. getrübt
57	Kind	5	Kontusionsverletz. rechts	8. 10.	dicht getrübt

1930

58	Bergmann	37	Sprengschußverletz. links	6. 11. 29	geschrumpft u. getrübt
59	Arbeiter	18	Schießbolzenverletz. rechts	26. 5.	in toto getrübt
60	Lok.-Führer	32	Eisensplitter rechts	19. 9.	fest u. toto weiß getr.
61	Monteur	21	Eisensplitter links	13. 1.	getrübt
62	Holzhauer	52	Nagelverletzung rechts	4. 9.	—
63	Steinbrucharbeiter	27	Kontusionsverletz. rechts	20. 2.	in toto getrübt
64	Arbeiter	25	Eisenstück geg. r. Auge	7. 10.	weiß getrübt und braune Ablagerungen
65	Schüler	9	Stein gegen recht. Auge	21. 5.	gequollen u. getrübt
66	Arbeiter	27	Eisensplitter rechts	5. 11.	damals dicht getrübt
67	Gärtner	18	Kontusionsverletz. rechts	20. 8.	in toto getrübt
68	Schlosser	63	Holzsplitter links	6. 10.	in toto getrübt
69	Steinbrucharbeiter	22	Eisensplitter links	26. 2.	diffus getrübt
70	Kind	5	Pistolenschuß links	17. 5.	diffus getrübt
71	Drahtflechter	35	Drahtverletzung rechts	17. 11.	in toto weißl. getrübt

a = Nach der Staroperation b = Nach der Nachstaroperation.

Op.	Compl.	Nachstar- Op.	Entl.	Visus Entl. mit Glas		Visus bei letzter Vorstellung
27. 5.	Glaskörpervorfall	—	26. 6.	^a Finger 1 m.	^b Entf.	idem
13. 4.	—	12. 6.	29. 4.	0,1	1,0	0,6
7. 11.	Ablatio retinae	—	4. 12.	0,2		Finger $\frac{1}{4}$ m. Entf.
7. 2.	—	—	1. 3.	0,5		0,5
15. 8.	—	—	3. 9.	0,1		0,16
15. 12.	—	—	8. 1.	0,1		0,1
27. 9.	—	—	11. 10.	0,8		0,8
19. 9.	—	—	28. 9.	nicht angegeben		
12. 9.	—	—	25. 9.	nicht angegeben		
20. 7.	—	7. 9.	1. 8.	0,1	0,12	0,2
10. 10.	Irisatrophie	—	19. 10.	Proj. +		—

9. 11.	—	10. 1. 30	22. 11. 29	0,1	0,1	0,1
31. 5.	—	—	14. 6.	Handbewegung		0,1
2. 10.	—	—	8. 11.	0,3		0,3
11. 2.	—	5. 11. 31	3. 3.	0,1	0,14	0,25
1928 i/Siegen	—	9. 9.	2. 10.		0,2	0,2
25. 2.	—		20. 3.	0,2		0,25
9. 10.	Ablatio retinae	—	8. 11.	0,3		Finger 1 m
23. 5.	—	—	7. 6.	0,2		0,2
1923 oper.	Glaskörpervorfall	8. 11.	29. 11.	0,1	0,1	0,1
23. 8.	—	9. 12.	22. 9.	0,16	0,2	0,2
9. 10.	—	—	8. 11.	0,4		0,4
1929	—	29. 3.	12. 4.	0,1	0,2	0,25
31. 5.	Ablatio retinae	—	7. 7.	0,1		Lichtschein
21. 11.	—	—	17. 12.	0,2		0,1

Fall	Beruf	Alter Jahre	Verletzung	Aufnahme	Linse
72	Schüler	14	Holzstück geg. r. Auge	24. 2. 31	diffus getrübt
73	Landwirt	43	Eisensplitter rechts	18. 3.	—
74	Kind	5	Scherenstich links	19. 4.	gequollen u. weiß getrübt
75	Hausangestellte	23	Holzstück geg. r. Auge	12. 5.	dicht getrübt

1931

76	Schüler	11	Dorne ins linke Auge	14. 2.	gequollen u. getrübt
77	Winzer	47	Holzsplitter rechts	16. 12.	in toto getrübt
78	Schüler	9	Eisensplitter rechts	26. 11.	gequollen u. getrübt
79	Arbeiter	33	Holzstück geg. r. Auge	11. 6.	getrübt
80	Ofenarbeiter	46	Drahtverletzung links	24. 8.	—
81	Arbeiter	40	Eisensplitter links	23. 2.	gequollen u. getrübt
82	Schüler	9	Dornenverletzung rechts	17. 10.	gequoll. u. milch. getrübt
83	Rentner	67	Eisenstück geg. r. Auge	6. 11.	gequollen u. getrübt
84	Kraftfahrer	26	Eisenstück geg. l. Auge	7. 1.	diffus getrübt

1932

85	Weichensteller	57	Holzsplitter links	25. 5.	dicht getrübt
86	Polizeiwachtmeister	22	Schußverletzung links	15. 8.	diffus getrübt
87	Schreiner	43	Eisensplitter rechts	26. 5.	gequollen u. grauweiß getrübt
88	Wächter	43	Kriegsschußverletz. rechts	17. 11.	dichte Trüb. verkalkt
89	Schlosser	48	Kontusionsverletz. rechts	11. 1.	dicht getrübt
90	Arbeiter	20	Steinsplitter links	4. 11.	in toto weiß getrübt
91	Landwirt	37	Steinsplitter rechts	20. 5.	gequoll. u. dicht getr.
92	Arbeiter	36	Celloidstück geg. l. Auge	1. 12.	dicht getrübt.
93	Bergmann	28	Sprengschußverletz. rechts	22. 10.	gequollen u. getrübt
94	Kind	5	Holzsplitter links	29. 9.	gequollen

a = Nach der Staroperation b = Nach der Nachstaroperation.

Op.	Compl.	Nachstar- Op.	Entl.	Visus Entl. mit Glas		Visus bei letzter Vorstellung
26. 2.	—	28. 11. 31	18. 3. 31	0,1 ^a	0,1 ^b	Handbeweg.
1929 i/Eschweil.	—	29. 3.	12. 4.	0,1	0,14	Dicht. Nachst. 0,3
26. 4.	—	2. 10.	13. 5.	0,1	0,1	0,16
31. 5.	—	—	12. 6.	0,2		0,5
3. 6.	—	—				
26. 2.	—	—	21. 3.	0,6		0,6
23. 1.	—	—	21. 2.	0,1		0,2
9. 12.	—	—	21. 12.	0,25		0,3
18. 6.	—	—	11. 7.	0,25		0,3
1930 in Trier	—	26. 8.	3. 9.	0,25	0,25	0,3
26. 2.	—	—	19. 3.	0,3		0,4
22. 10.	—	—	6. 11.	0,6		0,8
20. 11.	—	—	12. 12.	0,16		0,3
13. 1.	—	—	24. 1.	0,2		0,6
29. 5.						
14. 6.	Glaskörpervorfall	—	25. 6.	Projektion		—
19. 8.	—	—	15. 9.	0,5		1,0
15. 6.	—	—	15. 7.	0,3		0,6
26. 11.	—		23. 12.	0,1		0,3
14. 1.	—	3. 10.	12. 2.	0,2	0,3	0,25
8. 11.	Ablatio retinae	—	25. 11.	0,1		0,1
24. 5.	—	—	17. 6.	0,2		0,5
13. 12.	Irisschlott.	—	23. 12.	0,1		0,2
26. 11.	—	—	23. 12.	0,4		0,5
25. 10.	—	—	2. 11.	Proj. +		idem

1933

Fall	Beruf	Alter Jahre	Verletzung	Aufnahme	Linse
95	Maurer	34	Stahlsplitter links	4. 4.	getrübt
96	Konditor	31	Drahtstück links	3. 3.	diffus getrübt
97	Elektrotechniker	18	Eisenstück geg. l. Auge	25. 8.	weiß-grau getrübt
98	Maschinist	37	Eisenkette gegen r. Auge	20. 2.	grau getrübt
99	Landwirt	55	Stahlsplitter links	10. 3.	diffus getrübt
100	Arbeiter	22	Eisensplitter links	12. 9.	braun getrübt
101	Schüler	12	Holzstück geg. l. Auge	11. 3.	gequollen u. getrübt
102	Arbeiter	19	Steinsplitter links	10. 1.	gequoll. u. diff. getrübt
103	Landwirt	19	Eisensplitter rechts	10. 5. 12. 5.	toto getrübt
104	Steinhauer	39	Steinsplitter rechts	28. 4.	toto weiß getrübt
105	Steinbrucharbeiter	16	Steinsplitter rechts	1. 2. 4. 2.	in toto getrübt
106	Bergmann	27	Sprengschußverletz. rechts	14. 2.	geschrumpft u. diffus getrübt
107	Knecht	27	Holzstück geg. l. Auge	14. 8.	gequoll. u. dicht getr.

1934

108	Landwirt	29	Kontusionsverletz. rechts	28. 7.	getrübt
109	Schachtmeister	37	Steinsplitter links	2. 2.	gequollen u. getrübt
110	Steinkipper	21	Steinsplitter rechts	14. 9.	—
111	Schüler	10	Stein ins rechte Auge	12. 9.	geschrumpft u. getrübt
112	Landwirt	29	Holzreis geg. r. Auge	3. 4.	gequollen u. getrübt
113	Arbeiter	29	Eisensplitter links	4. 11.	gequoll. u. toto getrübt
114	Landwirt	47	Holzspan links	6. 7.	dicht getrübt
115	Landwirt	33	Stein geg. rechtes Auge	11. 5.	in toto getrübt
116	Ehefrau	64	Holzsplitter rechts	15. 3.	gequollen u. getrübt

a = Nach der Staroperation b = Nach der Nachstaroperation.

Op.	Compl.	Nachstar- Op.	Entl.	Visus Entl. mit Glas		Visus bei letzter Vorstellung
6. 4.	—	—	10. 5.	^a 0,1	^b	0,2
10. 3.	—	—	3. 4.	0,8		0,8
25. 8.	—	—	7. 9.	0,2		0,6
23. 2.	—	—	18. 3.	0,5		0,6
6. 4.	—	17. 5.	13. 5.	0,1	0,5	0,25
20. 9.	—	—	6. 10.	0,5		0,8
30. 3.	—	—	12. 4.	0,3		0,6
10. 1.	—	—	10. 2.	0,2		0,5
13. 1.	—	—	10. 2.	0,2		0,5
13. 6.	Glaskörpervorfall	—	24. 6.	0,1		0,3
4. 5.	—	—	24. 5.	0,16		0,2
14. 2.	—	6. 7. 34	4. 3.	0,5	0,5	0,5
16. 2.	—	—	4. 3.	0,2		0,2
19. 8.	—	19. 10.	7. 9.	0,1	0,3	0,3

2. 8.	Ablatio retinae	—	26. 8.	Lichtschimmer		—
13. 3.	Glaukom sec.	—	27. 5.	Handbeweg.		idem
1933 Neuwied	—	15. 9.	22. 9.	0,2	0,3	0,3
19. 9.	—	—	29. 9.	0,1		0,1
5. 4.	—	—	28. 4.	0,4		0,4
9. 11.	—	—	26. 11.	0,4		0,4
6. 7.	—	19. 7. 16. 5 1935	9. 8.	0,1	0,2	0,2
15. 5.	—	—	1. 6.	0,3		0,8
16. 3.	Ablatio retinae	—	20. 4.	Lichtschein		—

1935

Fall	Beruf	Alter Jahre	Verletzung	Aufnahme	Linse
114	Kind	7	Kontusionsverletz. links	20. 7.	gequollen u. getrübt
118	Schlosser	15	Eisensplitter rechts	28. 6.	diffus getrübt
119	Tiefbauarbeiter	49	Steinsplitter rechts	12. 8.	total getrübt
120	Streckenarbeiter	37	Kontusionsverletz. rechts	8. 10.	in toto getrübt
121	Arbeiter	20	Dorne in's rechte Auge	3. 4.	geschrumpft verkalkt
122	Arbeiterin	22	Steinsplitter	23. 5.	gequollen
123	Schülerin	8	Nadel in's rechte Auge	7. 5.	total getrübt

1936

124	Schlosser	28	Pulververletzung rechts	4. 5.	total getrübt Kristalle
125	Landwirt	36	Steinsplitter rechts	3. 4.	—
126	Schüler	8	Schuß ins linke Auge	26. 10.	total getrübt
127	Landwirt	42	Draht ins rechte Auge	7. 4.	total getrübt
128	Ziegeleiarbeiter	52	Steinsplitter	15. 1.	diffus getrübt
129	Landwirt	16	Eisensplitter rechts	4. 3.	in toto getrübt
130	Schüler	8	Perf. Verletzung rechts	5. 1.	gequollen u. getrübt
131	Arbeiter	23	Eisensplitter links	24. 1.	getrübt verkalkt
132	Landwirt	48	Baumast geg. lk. Auge	18. 12.	gequollen u. getrübt
133	Näherin	19	Nadelstück ins rechte Auge	17. 4.	diffus getrübt

a = Nach der Staroperation b = Nach der Nachstaroperation.

Op.	Compl.	Nachstar- Op.	Entl.	Visus Entl. mit Glas		Visus bei letzter Vorstellung
30. 7.	Glaskörpervorfall Irisatrophie	—	4. 9.	^a 0,16	^b	0,1
29. 6.	Panopthalmie Evisceration	—	26. 8.	—		—
15. 8.	Glaskörpervorfall	4. 6. 36.	29. 8.	Lichtschein		Proj. +
16. 10.	—	—	5. 11.	0,5		0,6
6. 4.	—	—	19. 4.	0,1		0,1
14. 6.	—	—	18. 7.	0,1		0,2
9. 5.	?	29. 11.	3. 6.	Lichtschein		
18. 5.						

7. 5.	—	—	23. 5.	0,5		0,5
i/Beuel oper.	—	18. 4.	23. 5.	0,1	0,2	0,2
29. 10.	—	—	13. 11.	0,1		1,0
1. 11.	—	—	8. 4.	0,2		0,2
9. 4.	—	18. 4. 1937	30. 1.	1,0	0,8	1,0
18. 1.	—	—	23. 3.	1,0		1,0
5. 3.	—	—	30. 1.	0,4		0,4
14. 1.	—	—	15. 2.	0,6		0,6
28. 1.	—	—	22. 2. 1937	1,0		1,0
14. 1.	—	—	6. 5.	Lichtschimmer		—
18. 4.	Ablatio retinae	—				

Die Aufstellungen zeigen, daß von den 133 operierten Fällen 16,55% erblindeten, und zwar durch:

Ablatio retinae	6,77%
Infektionen	2,66%
Sec. Glaucom	3,00%
Spätinfektionen	2,26%
Glaskörpervorfall	2,26%.

Bei 7 Kranken trat während der Operation ein Vorfall des Glaskörpers ein, wodurch 3 Augen, die daher auch in der obigen Aufstellung aufgenommen wurden, erblindeten. Von den übrigen 4 erreichten 3 eine Sehschärfe von 0,1 und 1 von 0,3. Diese Operationsergebnisse seien denen in einer früheren Arbeit (Diff. Matthes) bei 157 Fällen von Altersstaren der hiesigen Klinik gefundenen, gegenübergestellt. Operateure, Operationstechnik und Nachbehandlung waren in den weitaus meisten Fällen die gleichen.

Von den wegen Altersstar operierten Augen erblindeten 3,24% und zwar durch:

Ablatio retinae	0,93%
Sec. Glaucom	0,46%
Infektionen	1,85%.

Die Zusammenstellung zeigt also in eindeutiger Weise, daß die Ausfälle bei den Wundstaren einen erheblich höheren Prozentlaß ausmachen als bei den Altersstaren.

Matthes bezeichnet die Ablatio als Seltenheit bei der intrakapsulären Altersstarextraktion, während bei den Wundstaroperationen die Ablatio die häufigste Ursache der Erblindung war. Die Ursache der postoperativen Netzhautablösung kennen wir nicht.

Verständlich ist auch der höhere Prozentfuß der Infektionen, obwohl in den meisten Fällen erst nach Heilung der übrigen Augenverletzungen extrahiert wurde. Durch den erneuten Eingriff werden wahrscheinlich die bei dem Unfall eingedrungenen Erreger wieder aktiviert.

Den 3 Prozent beim Wundstar wegen sec. Glaucoms Erblindeten stehen nur 0,46 Prozent von Matthes beim Altersstar gefundenen gegenüber. Der Grund dieses großen Unterschiedes liegt wohl in der Verletzung selbst, Verletzung der Linse, Iritis, Vernarbungsprozesse, Staphylome usw.

Bei der letzten Vorstellung — letztes Datum der Krankengeschichte — wurden folgende Sehschärfenwerte erreicht:

Lesetafel Blascovisc.

0,1—————0,3	41,17%
0,4—————0,6	27,44%
0,7—————1,0	12,28%
nicht angegeben	2,26%.

Diese Ergebnisse seien wieder denen bei den Altersstaren durch Prüfung mit der Löhlein'schen Tafel gefundenen gegenübergestellt:

—————0,1	6,37%
0,2—————0,4	12,10%
0,5—————1,0	64,32%

Zu dieser endgültigen Visusbestimmung kommen noch 10,83%, die nicht zur endgültigen Visusbestimmung erschienen sind und weitere 4,46%, die vorzeitig die Klinik verließen (Matthes).

Es wurde also bei den wegen Altersstar Operierten eine entschieden bessere Sehschärfe erzielt, als bei den Wundstaroperierten, denn bei letzteren

nimmt der Hundertsatz von den niederen Sehschärfenwerten zu den höheren ständig ab, während dieses bei den ersteren umgekehrt der Fall ist. Das schlechtere Sehvermögen bei den Wundstaroperierten mag seinen Grund in den durch den Unfall hervorgerufenen Nebenverletzungen haben.

Über die Dauer der stationären Behandlung soll folgende Aufstellung Aufschluß geben:

Aufenthalt bis 20 Tage	= 49 Patienten	= 36,84%
" " 30 "	= 42 "	= 31,58%
" " 40 "	= 26 "	= 19,55%
" länger	= 16 "	= 12,03%

Diese Tabelle ist nach den Daten der Krankengeschichte errechnet. Die 20- bis 40-tägige Behandlungsdauer bezieht sich lediglich auf die Behandlung nach der Linienentbindung. Sie begann also mit dem Tage der Operation, wenn die Patienten nach Abheilung der Nebenverletzungen zur endgültigen Wundstarbehandlung wieder in die Klinik kamen, während bei den über 40 Tage Behandelten solche sind, die vom Tage des Unfalls bis nach der Wundstarbehandlung ohne Unterbrechung in der Klinik geblieben sind. Der Klinikaufenthalt betrug im Durchschnitt 4 Wochen, bei Matthes' Fällen 14 Tage.

Um einen Überblick über das verbliebene Sehvermögen zu gewinnen, wurden an 120 Patienten Fragebögen geschickt, da es leider nicht möglich war, eine Nachuntersuchung in der Klinik durchzuführen. Die Fragebögen hatten folgenden Wortlaut:

1. Können Sie heute noch mit dem Auge sehen?
2. Benutzen Sie die Stargläser?
 - a) Für die Nähe?
 - b) Für die Ferne?
 - c) Dauernd oder nur gelegentlich?

3. Schielt das Auge?
4. Erhalten Sie eine Rente?
 Wenn ja, wieviel ‰?
 Von welcher Berufsgenossenschaft?
 Aktenzeichen?
5. Sind Sie inzwischen wegen des operierten Auges anderweitig in Behandlung gewesen?
 Welche Beschwerden hatten Sie und worin bestand die Behandlung?

Wir erhielten 101 Antworten, davon ließen sich allerdings nur 88 (= 87,13%) verwerten, da in-
 zwischen 13 Patienten verstorben sind. Von diesen
 88 Patienten können heute noch 74 (=83,62%) mit
 dem Auge sehen. Die Verneinung dieser Fragen
 wurde bei den Patienten, die, obwohl sie versichert
 sind, keine Rente bekommen, sehr skeptisch behan-
 delt. Es ist nämlich anzunehmen, daß es in der
 Hoffnung auf ein neues Rentenverfahren geschah.
 Sie wurden daher zu denen gerechnet, die noch
 mit dem Auge sehen können.

Dauernd getragen werden die Stargläser von
 19 Patienten = 26,93% (umgerechnet auf die 74 Pa-
 tienten). 23 Patienten = 31,5% tragen sie gelegent-
 lich für die Nähe, sowie für die Ferne. Die Star-
 gläser werden demnach getragen von 57,54%. Die
 Gläsertragenden verteilen sich auf folgende Berufe:

Steinbruch=	}	Arbeiter	16
Erd=			
Berg=			
Fabrik=			
Landwirte			7
Schlosser			5
Schüler			5
akt. Gefreiter			1

Lok.-Führer	1
Schreiner	2
Schmied	2
Winzer	1
Hausmädchen	2

Die Stargläser werden von 32 Patienten, die über Schwindel, Kopfschmerzen und Stechen klagen, abgelehnt.

Nach Angabe der Patienten schielt das Auge in 30 Fällen = 33,90% (umgerechnet auf die 88 Pat.). Von den Versicherten erhalten heute noch an Rente:

1. a) 40% 1 Pat.
- b) 33% 3 „
- c) 25% 11 „
- d) 20% 2 „
- e) 15% 1 „
- f) 10% 1 „

2. Von den Rentenpflichtigen erhalten keine Rente:

Keine Rente	43 Pat.
Wegfall durch Notverordnung	5 „
abgefunden	6 „

15 Patienten, die eine Rente von 25% und höher bekommen, können als praktisch erblindet auf dem verletzten Auge gelten; das sind 20,35% von 73 Versicherten. Es läßt sich allerdings nicht mit Sicherheit sagen, ob die 4 Verletzten mit einer Rente über 25% dieses Mehr wegen einer weiteren Verletzung erhalten.

Es erblindeten also von den dieser Arbeit zugrunde liegenden Fällen 16,55% der operativ behandelten Augen. Weshalb es zu einer Späterblindung bei 2 Glaskörpervorfällen kam, ist leider aus den Krankenblättern nicht zu ersehen. Es handelt

sich um die Fälle 47 und 85. In einem Falle (Fall 2) mußte das Auge 7 Jahre nach der Operation wegen Spätfektion enucleiert werden. Den 16,55% nach Wundstaroperation stehen 3,24% nach Altersstaroperation Erblindeten gegenüber. Der Unterschied ist verhältnismäßig groß. Es ist aber immerhin ein guter Erfolg, wenn von den übrigen 83,45% über 40% den Sehschärfenwert 0,4 erreichten. Aus beruflichen und sozialen Gründen kann man zur Operation raten.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. K. Schmidt für die freundliche Überlassung der Arbeit und die mir gewährten Ratschläge und tatkräftige Hilfe herzlichst zu danken.

Literatur.

- Lange und Miles: Rückbildung traum. Katarakte. Kli. Mtbl. Augenheilkunde. Bd 50, S. 553.
Libby: Behandlung eines traum. Katarakts. Kli. Mtbl. Augenheilkunde. Bd. 46, S. 235.
Matthes: Diss. Bonn 1936. Unsere Operationstechnik und unsere Ergebnisse bei der intrakapsulären Staroperation.
Marzolph: Über den Einfluß des Tragens von Starbrillen. Kli. Mtbl. Augenheilkunde. Bd. 53.
Schieck-Brückner; Handbuch der Augenheilkunde. Bd. 4.
Wagemann: Verletzungen des Auges mit Berücksichtigung der Unfallversicherung. Bd. 1—3.
Wilbot und Wolf: Behandlung des Wundstares. Kli. Mtbl. Augenheilkunde, Bd. 87, S. 49—54.

Lebenslauf.

Am 11. August 1914 wurde ich, Günther Spannagel, als Sohn des Amtsinspektors Karl Spannagel und seiner Ehefrau Adeline, geb. Strepel in Lüdenscheid (Westf.) geboren. Nach 4jährigem Besuch der Volksschule kam ich 1924 auf das Zeppelin-Realgymnasium in Lüdenscheid, das ich nach bestandener Reifeprüfung 1933 verließ. Die vor-klinischen Semester belegte ich in Göttingen und Marburg, wo ich im Sommer 1935 die ärztliche Vorprüfung ablegte. Die klinischen Vorlesungen hörte ich in Köln und Bonn, wo ich im Winter 1938/39 mein Studium mit der ärztlichen Staatsprüfung abschloss.
